



Folkhälsomyndigheten

# Resultat i tabellform

Bilaga 1 till Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2022



# Innehåll

Resultat i tabellform .....	1
Innehåll.....	2
Läsanvisningar .....	3
Målområde 1 – Det tidiga livets villkor .....	4
Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning .....	5
Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.....	6
Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter .....	8
Målområde 5 – Boende och närmiljö .....	11
Målområde 6 – Levnadsvanor .....	12
Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet.....	14
Målområde 8 – En hälsofrämjande hälso- och sjukvård .....	16
Hälsa.....	18

## Läsanvisningar

I denna bilaga, som är en av tre bilagor till Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2022, finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten utifrån ett nuläge baserat på senast tillgänglig data samt utvecklingen över tid inom olika grupper i befolkningen. Tabellerna är uppdelade utifrån det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden samt ett separat hälsoavsnitt. Varje indikator redovisas utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och födelse land i den mån information finns tillgänglig. På [Folkhälsomyndighetens webbplats](#) finns mer information om indikatorerna.

Där det är möjligt redovisas åldersstandardiserade siffror. Ålderstandardisering har gjorts för att justera för effekten av att åldersfördelningen kan vara olika mellan befolkningsgrupper och över tid. Till exempel finns det en större andel äldre både i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå och i gruppen födda i övriga Norden (utanför Sverige) jämfört med övriga utbildningsgrupper och övriga grupper av födelse länder, vilket påverkar hälsan i dessa grupper.

Pilarna i tabellerna visar utvecklingen över tid, både inom respektive grupp och ojämlikhet mellan två grupper. Uppåtgående pil visar på en ökning, nedåtgående pil visar på en minskning och horisontell pil visar att det inte har skett någon signifikant utveckling under perioden. Avsaknad av pil betyder att analys inte har utförts, vilket kan ha flera olika anledningar, som till exempel att antalet personer är otillräckligt för att möjliggöra analys.

Förändringen över tid inom respektive grupp kan vara signifikant ökande eller minskande trots att utvecklingen gått både upp och ner under perioden. I dessa fall är pilens riktning oftast ett utslag av utvecklingen under den senare delen av perioden. Färgen på pilen visar i sin tur om förändringen har varit positiv eller negativ ur ett hälsoperspektiv under perioden. Grön pil betyder att förändringen har varit positiv och röd pil betyder att förändringen har varit negativ.

I bilaga 2 finns detaljerad beskrivning av indikatorerna.

I metodbeskrivningen i bilaga 3 finns information om hur analyserna har utförts.

# Målområde 1 – Det tidiga livets villkor

Tabell 1a. Barn inskrivna på förskolan vid tre års ålder (andelar i procent), fördelat på kön och föräldrarnas utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2014–2020.

Indikator	Totalt	Flickor	Pojkar	För-gymnasial	Gymnasial	Efter-gymnasial
Barn inskrivna på förskolan	95	95	95	90	95	96
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 1b. Barn inskrivna på förskolan vid tre års ålder (andelar i procent), fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2014–2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Barn inskrivna på förskolan	95	96	86	76	76
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

## Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning

Tabell 2a. Elever med behörighet till gymnasiet respektive slutbetyg från gymnasiet (andelar i procent), fördelat på kön och föräldrarnas utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021 för gymnasiebehörighet och 2015–2021 för gymnasieexamen.

Indikator	Totalt	Flickor	Pojkar	För-gymnasial	Gymnasial	Efter-gymnasial
Gymnasiebehörighet	86	87	86	53	81	93
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	→
Gymnasieexamen	72	76	68	37	68	82
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 2b. Elever med behörighet till gymnasiet respektive slutbetyg från gymnasiet (andelar i procent), fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2006–2021 för gymnasiebehörighet och 2015–2021 för gymnasieexamen.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Gymnasiebehörighet	87	90	89	79	62
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	→	→
Gymnasieexamen	72	79	73	61	37
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

## Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Tabell 3.1a. Sysselsättning i befolkningen (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på kön och ålder, 2020.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	25–34	35–44	45–54	55–64
Sysselsättning	83	81	86	80	87	88	78

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.1b. Sysselsättning i befolkningen (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på utbildningsnivå, 2020.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Sysselsättning	83	58	83	88

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.1c. Sysselsättning i befolkningen (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på födelseland, 2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Sysselsättning	83	88	81	82	61

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.2a. Långtidsarbetslöshet\* i arbetskraften (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på kön och ålder, 2020.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	25–34	35–44	45–54	55–64
Långtidsarbetslöshet	1,1	1,1	1,1	0,8	1,1	1,2	1,5

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. För att läsa mer, se bilaga 2.

Tabell 3.2b. Långtidsarbetslöshet\* i arbetskraften (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på utbildningsnivå, 2020.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Långtidsarbetslöshet	1,1	4,6	1,1	0,7

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. För att läsa mer, se bilaga 2.

Tabell 3.2c. Långtidsarbetslöshet\* i arbetskraften (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på födelse-land, 2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Långtidsarbetslöshet	1,1	0,5	–	1,7	4,5

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader. För att läsa mer, se bilaga 2.

Tabell 3.3a. Krav-kontroll och fysisk påfrestning i arbetet bland sysselsatta (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på kön och ålder, 2019.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	25–34	35–44	45–54	55–64
Höga krav – låg kontroll	22	28	17	22	22	22	22
Fysisk påfrestning	22	21	23	23	20	21	25

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.3b. Krav-kontroll och fysisk påfrestning i arbetet (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på utbildningsnivå, 2019.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Höga krav – låg kontroll	22	21	23	22
Fysisk påfrestning	22	29	33	14

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.3c. Krav-kontroll och fysisk påfrestning i arbetet (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på födelse-land, 2019.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Höga krav – låg kontroll	22	22	18	19	28
Fysisk påfrestning	22	22	30	17	26

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

## Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter

Tabell 4.1a. Ekonomisk standard\* (tusental kronor), medianvärden, 25–64 år, fördelat på kön och utbildningsnivå, 2019.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Ekonomisk standard	289,6	286,1	292,9	221,3	281,3	317,4

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\*Ekonomisk standard definieras som en summa för hushållsmedlemmarnas disponibla inkomster inklusive transfereringar och kapitalinkomster med hänsyn tagen till hushållets storlek och sammansättning. För mer information se bilaga 2.

Tabell 4.1b. Ekonomisk standard\* (tusental kronor), medianvärden, fördelat på ålder, 2019.

Indikator	0–14	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Ekonomisk standard	233,1	261,8	262,2	323,0	235,4	177,0

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\*Ekonomisk standard definieras som en summa för hushållsmedlemmarnas disponibla inkomster inklusive transfereringar och kapitalinkomster med hänsyn tagen till hushållets storlek och sammansättning. För mer information se bilaga 2.

Tabell 4.1c. Ekonomisk standard\* (tusental kronor), medianvärden, 25–64 år, fördelat på födelse land, 2019.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Ekonomisk standard	289,6	306,9	297,6	254,9	202,7

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\*Ekonomisk standard definieras som en summa för hushållsmedlemmarnas disponibla inkomster inklusive transfereringar och kapitalinkomster med hänsyn tagen till hushållets storlek och sammansättning. För mer information se bilaga 2.

Tabell 4.2a. Låg ekonomisk standard\* (andelar i procent), 20 år och äldre, fördelat på kön och ålder, 2019 samt utvecklingen 2011–2019. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	20–29	30–44	45–64	65–84	85–
Låg ekonomisk standard	14	15	12	17	15	10	13	28
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.



\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

Tabell 4.2b. Låg ekonomisk standard\* (andelar i procent), 25 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, 2018 samt utvecklingen 2011–2019. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Låg ekonomisk standard	13	28	12	8,0
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

Tabell 4.2c. Låg ekonomisk standard\* (andelar i procent), 20 år och äldre, fördelat på födelseland, 2019 samt utvecklingen 2011–2019. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Låg ekonomisk standard	14	10	20	22	38
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↘	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

Tabell 4.3a. Låg ekonomisk standard\*, barn (andelar i procent), 0–19 år, fördelat på ålder, 2019 samt utvecklingen 2011–2019.

Indikator	Totalt	0–4	5–9	10–14	15–19
Låg ekonomisk standard, barn	20	23	21	18	17
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	→	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

Tabell 4.3b. Låg ekonomisk standard\*, barn (andelar i procent), 0–19 år, fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå, 2019 samt utvecklingen 2011–2019.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Låg ekonomisk standard, barn	20	68	24	12
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	→

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

Tabell 4.3c. Låg ekonomisk standard\*, barn (andelar i procent), 0–19 år, fördelat på födelseland, 2019 samt utvecklingen 2011–2019.

<b>Indikator</b>	<b>Totalt</b>	<b>Sverige</b>	<b>Övriga Norden</b>	<b>Övriga Europa</b>	<b>Övriga världen</b>
Låg ekonomisk standard, barn	20	16	35	30	62
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↘	↘	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

## Målområde 5 – Boende och närmiljö

Tabell 5.1a. Problem i boende och närmiljö (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Störd sömn av trafikbuller*	5,5	5,3	5,7	6,9	5,0	5,4	5,0
Avstått att gå ut ensam av rädsla	29	45	14	39	27	25	30
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 5.1b. Problem i boende och närmiljö (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Störd sömn av trafikbuller**	5,3	10	5,8	4,2
Avstått att gå ut ensam av rädsla	28	28	28	26
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\*Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 5.1c. Problem i boende och närmiljö (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2006–2021.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Störd sömn av trafikbuller*	5,5	4,2	3,6	7,0	13,4
Avstått att gå ut ensam av rädsla	29	29	31	30	27
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	→

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

## Målområde 6 – Levnadsvanor

Tabell 6a. Levnadsvanor (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Alkohol, riskkonsumtion	15	13	18	19	15	17	11
Utveckling inom resp. grupp	↘	→	→	↘	→	↗	↗
Tobaksrökning, daglig	6,0	5,9	5,9	3,0	5,2	7,8	7,1
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Grönsaks- och rotfruktsintag, dagligt	34	42	27	36	42	33	25
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘
Cannabisanvändning*	2,6	1,9	3,5	7,2	3,6	0,6	0,2
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Fysisk aktivitet**	67	68	67	71	71	67	58

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\*Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

\*\* Indikatorn började följas från 2016 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 6b. Levnadsvanor (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Alkohol, riskkonsumtion	15	17	17	14
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	→
Tobaksrökning, daglig	6,5	17	7,8	3,3
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Grönsaks- och rotfruktsintag, dagligt	34	22	27	43
Utveckling inom resp. grupp		→	→	↗
Cannabisanvändning**	2,1	3,3	2,0	2,0
Utveckling inom resp. grupp		→	↗	↗
Fysisk aktivitet***	67	52	64	75

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\* Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

\*\*\* Indikatorn började följas från 2016 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 6c. Levnadsvanor (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2006–2021.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Alkohol, riskkonsumtion	15	17	18	12	6,9
Utveckling inom resp. grupp	→	↘	↗	→	→
Tobaksrökning, daglig	6,0	5,3	11	10	7,1
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘
Grönsaks- och rotfruktsintag, dagligt	34	33	31	37	38
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	→
Cannabisanvändning*	2,6	2,6	1,4	3,3	2,7
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	↗	↗
Fysisk aktivitet**	67	70	61	59	48

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\*Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

\*\* Indikatorn började följas från 2016 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

## Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet

Tabell 7.1a. Sociala interaktioner (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Tillit till andra, låg	28	28	29	43	30	23	20
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	→	→
Utsatt för kränkande behandling eller bemötande*	19	22	15	28	20	18	8,1
Utveckling inom resp. grupp	→	↗	↘	→	↘	→	→
Utsatt för våld eller hot om våld**	5,2	5,1	5,5	8,4	5,6	5,2	2,0
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	↘	→	↗	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Utsatt för kränkande behandling eller bemötande avser senaste 3 månaderna.

\*\* Utsatt för våld eller hot om våld avser senaste 12 månaderna.

Tabell 7.1b. Sociala interaktioner (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Tillit till andra, låg	26	43	30	18
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Utsatt för kränkande behandling eller bemötande**	17	19	17	18
Utveckling inom resp. grupp		↗	→	↘
Utsatt för våld eller hot om våld***	4,7	6,8	5,0	4,2
Utveckling inom resp. grupp		→	→	→

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\* Utsatt för kränkande behandling eller bemötande avser senaste 3 månaderna.

\*\*\* Utsatt för våld eller hot om våld avser senaste 12 månaderna.

Tabell 7.1c. Sociala interaktioner (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2006–2021.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Tillit till andra, låg	28	25	24	38	46
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	↘
Utsatt för kränkande behandling eller bemötande*	18	18	17	22	19
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	→	↘
Utsatt för våld eller hot om våld**	5,2	4,8	4,6	6,5	7,1
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	→	↘

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Utsatt för kränkande behandling eller bemötande avser senaste 3 månaderna.

\*\* Utsatt för våld eller hot om våld avser senaste 12 månaderna.

Tabell 7.2a. Valdeltagande (andelar i procent), 18 år och äldre, fördelat på kön och ålder, 2018. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	18–29	30–44	45–64	65–84	85–
Valdeltagande	84	86	83	81	82	87	88	68

Tabell 7.2b. Valdeltagande (andelar i procent), 18 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, 2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Valdeltagande	85	72	85	91

Tabell 7.2c. Valdeltagande (andelar i procent), 18 år och äldre, fördelat på födelseland, 2018. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Valdeltagande	84	90	65	55	63

## Målområde 8 – En hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tabell 8.1. Barn födda 2018 som vid två års ålder är vaccinerade\* mot sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet (andelar i procent), 2020.

Indikator	Totalt
Difteri	97,3
Stelkramp	97,3
Kikhosta	97,3
Polio	97,3
Hib	97,2
Pneumokocksjukdom	97,0
Hepatit B	97,2
Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)	97,1

Källa: Barnhälsovården (datainsamlingen sker aggregerat och kan därför inte redovisas uppdelat per kön).

\* Vaccinerade med tre doser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Pneumokocksjukdom och hepatit B samt med en dos mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).

Tabell 8.2. Flickor och pojkar födda 2009 som är vaccinerade med HPV-vaccin (andelar i procent), vaccinationsdatum till och med 2021-12-31.

Indikator	Flickor	Pojkar
Minst en dos	90	85
Minst två doser	83	78

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 8.3a. Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2021 samt utvecklingen 2006–2021\*. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov	8,4	7,7	9,0	5,6	11	9,8	6,4
Utveckling inom resp. grupp*	↘	↘	↘	↘	↘	↘	→

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Frågan ingick inte i enkäten 2015 och 2016. Trendanalysen är baserad på information från övriga år.



Tabell 8.3b. Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021\*\*. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov	9	21	12	5,4
Utveckling inom resp. grupp**		→	↘	↘

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\* Frågan ingick inte i enkäten 2015 och 2016. Trendanalysen är baserad på information från övriga år.

Tabell 8.3c. Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2021 samt utvecklingen 2006–2021\*.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov	8,4	6,4	10,4	12,4	18,4
Utveckling inom resp. grupp*	↘	↘	→	↘	↘

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Frågan ingick inte i enkäten 2015 och 2016. Trendanalysen är baserad på information från övriga år.

# Hälsa

Tabell 9.1a. Medellivslängd (år kvar att leva), fördelat på kön och utbildningsnivå, 2020. Utbildningsnivå redovisas endast för inrikes födda.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	För-gymnasial	Gymnasial	Efter-gymnasial
Medellivslängd vid födseln	82,4	84,3	80,6	–	–	–
Medellivslängd vid 30 års ålder	53,1	54,7	51,4	49,3	52,8	55,7

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.1b. Medellivslängd (år kvar att leva), fördelat på födelseland, 2020

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Medellivslängd vid 30 års ålder	53,1	53,1	51,7	52,9	53,5

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.2a. Förtida dödsfall (antal per 100 000), 15–64 år, fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64
Förtida dödlighet	156	117	194	39	63	318
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	→	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.2b. Förtida dödsfall (antal per 100 000), 25–64 år, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Förtida dödlighet	184	334	203	112
Utveckling inom resp. grupp		→	↘	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.2c. Förtida dödsfall (antal per 100 000), 15–64 år, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Förtida dödlighet	156	158	179	150	144
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.3a. Självskattad hälsa eller ohälsa (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Självskattad hälsa	74	73	77	80	82	73	63
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↘	↗	↗	↗
Psykiskt välbefinnande*	86	84	87	79	86	88	89
Ängslan, oro eller ångest	43	52	34	57	45	38	34
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Stress	15	19	12	27	18	13	5,0
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	→	→
Psykisk påfrestning, allvarlig**	9,6	12	8,0	16	11	7,1	5,6
Övervikt och fetma	52	45	57	31	48	62	60
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

\*\* Indikatorn började följas från 2020 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 9.3b. Självskattad hälsa eller ohälsa (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2021 samt utvecklingen 2006–2021. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Självskattad hälsa	74	62	73	79
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Psykiskt välbefinnande**	87	80	86	89
Ängslan, oro eller ångest	41	48	40	40
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Stress	14	15	14	13
Utveckling inom resp. grupp		→	↗	↗
Psykisk påfrestning, allvarlig***	8,5	17	9,5	6,6
Övervikt och fetma	55	65	61	47
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\* Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

\*\*\* Indikatorn började följas från 2020 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 9.3c. Självskattad hälsa eller ohälsa (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelse-land, 2021 samt utvecklingen 2006–2021.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Självskattad hälsa	74	74	71	76	77
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗
Psykiskt välbefinnande*	86	86	90	83	83
Ängslan, oro eller ångest	43	42	33	42	46
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	→
Stress	15	15	8,7	17	18
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	↘
Psykisk påfrestning, allvarlig**	9,6	8,5	4,6	11	17
Övervikt och fetma	52	52	55	54	52
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\*Indikatorn började följas från 2018 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

\*\*Indikatorn började följas från 2020 års enkät, vilket innebär för få mätpunkter för att beräkna utvecklingen över tid.

Tabell 9.4a. Psykosomatiska besvär, barn (andelar i procent), 11, 13 och 15 år, fördelat på kön och ålder, 2017/18.

Indikator	Flickor 11 år	Flickor 13 år	Flickor 15 år	Pojkar 11 år	Pojkar 13 år	Pojkar 15 år
Psykosomatiska besvär, barn	41	52	62	30	28	35

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.4b. Psykosomatiska besvär, barn (andelar i procent), 11, 13 och 15 år, fördelat på kön och socioekonomisk situation, 2017/18.

Indikator	Flickor dålig situation	Flickor genomsnittlig situation	Flickor bra situation	Pojkar dålig situation	Pojkar genomsnittlig situation	Pojkar bra situation
Psykosomatiska besvär, barn	83	69	49	55	43	29

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.4c. Psykosomatiska besvär, barn (andelar i procent), 11, 13 och 15 år, fördelat på kön och födelse-land, 2017/18.

Indikator	Flickor födda i Sverige	Flickor födda utomlands	Pojkar födda i Sverige	Pojkar födda utomlands
Psykosomatiska besvär, barn	53	51	32	25

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.5a. Avlidna (antal per 100 000), 15 år och äldre\*, fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Suicid	14	7,7	20	12	12	16	13	18
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	↗	↗	→	→	→
Cirkulationsorganens sjukdomar	328	262	401	1,4	5,4	65	609	5 757
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Bröstcancer**	32	32	0,3	0,1	5,8	23	75	194
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘			→	↘	↘	↗
Lungcancer	42	40	42	0,1	0,4	17	145	180
Utveckling inom resp. grupp	↘	↗	↘		↘	↘	→	↗
Prostatacancer***	53	–	50	0,0	0,0	6,3	142	973
Utveckling inom resp. grupp	↘		↘			↘	↘	→
Tjock- och ändtarmscancer	32	28	35	0,1	1,6	14	88	271
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘		→	↘	↘	→
Läkemedels- och narkotikaförgiftn.	10	7,0	12	8,2	12	11	6,5	4,9
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	→
Alkoholindex	24	12	37	1,4	3,6	28	66	23
Utveckling inom resp. grupp	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↗
Oavsiktliga skador och förgiftningar	38	26	52	9,6	11	16	58	521
Utveckling inom resp. grupp	→	→	↘	→	↗	↘	↘	↗

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Trendanalyserna (utveckling inom respektive grupp) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

\*\* För bröstcancer redovisas för totalt, ålder, utbildningsnivå och födelseland endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varför denna siffra också redovisas separat.

\*\*\* För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer. Dessa invånare är få, vilket gör dataunderlaget otillräckligt för analys.

Tabell 9.5b. Avlidna (antal per 100 000), 25 år och äldre\*, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Suicid	14	22	17	10
Utveckling inom resp. grupp		→	→	→
Cirkulationsorganens sjukdomar	380	456	372	277
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Bröstcancer**	37	44	35	35
Utveckling inom resp. grupp		→	↘	↘
Lungcancer	47	66	50	27
Utveckling inom resp. grupp		↗	↘	↘
Prostatacancer***	59	67	58	50
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Tjock- och ändtarmscancer	36	42	36	31
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar	10	27	12	5,1
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	→
Alkoholindex	28	42	32	15
Utveckling inom resp. grupp		→	↘	↘
Oavsiktliga skador och förgiftningar	42	63	45	32
Utveckling inom resp. grupp		→	→	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Trendanalyserna (utveckling inom respektive grupp) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

\*\* För bröstcancer redovisas för totalt, ålder, utbildningsnivå och födelseland endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varför denna siffra också redovisas separat.

\*\*\* För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer. Dessa invånare är få, vilket gör dataunderlaget otillräckligt för analys.

Tabell 9.5c. Avlidna (antal per 100 000), 15 år och äldre\*, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Suicid	14	15	16	12	7,6
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	↘	↘
Cirkulationsorganens sjukdomar	328	324	357	305	230
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘		↘	↘
Bröstcancer**	32	32	34	27	24
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	↘	↘
Lungcancer	42	39	50	52	34
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘
Prostatacancer***	53	51	54	42	23
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘
Tjock- och ändtarmscancer	32	31	37	32	22
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	↘	→
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar	10	11	9,3	7,0	4,3
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	→	→
Alkoholindex	24	25	39	17	4,6
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	↘
Oavsiktliga skador och förgiftningar	38	39	39	27	23
Utveckling inom resp. grupp	→	→	↘	↘	→

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Trendanalyserna (utveckling inom respektive grupp) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

\*\* För bröstcancer redovisas för totalt, ålder, utbildningsnivå och födelseland endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varför denna siffra också redovisas separat.

\*\*\* För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget otillräckligt för analys.

Tabell 9.6a. Spädbarnsdödlighet (antal per 1 000 levande födda), fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020.

Indikator	Flickor första levnadsveckan	Flickor första levnads-månaden	Flickor första levnads-året	Pojkar första levnads-veckan	Pojkar första levnads-månaden	Pojkar första levnads-året
Spädbarnsdödlighet	0,1	1,5	2,0	1,3	1,9	2,7
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	→	→

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.6b. Spädbarnsdödlighet (antal per 1 000 levande födda), första levnadsåret, fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Spädbarnsdödlighet	2,4	3,9	2,4	2,1
Utveckling inom resp. grupp	↘	→	↘	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.6c. Spädbarnsdödlighet (antal per 1 000 levande födda), första levnadsåret, fördelat på moderns födelseland, 2020 samt utvecklingen 2006–2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Spädbarnsdödlighet	2,4	1,9	2,4	2,7	3,7
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	→	→

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.7a. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Våldsrelaterade skador 15 år och äldre	128	103	151	302	141	76	17	8,8
Utveckling inom resp. grupp	↘	↗	↘	↘	→	→	→	→
Fallolyckor bland äldre	4 903	5 379	4 243	–	–	–	3 814	12 413
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗				↗	↗

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.7b. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Våldsrelaterade skador 25 år och äldre	91	263	107	41
Utveckling inom resp. grupp		↗	↘	↘
Fallolyckor bland äldre	4 865	4 964	4 959	4 707
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.



Tabell 9.7c. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Våldsrelaterade skador 15 år och äldre	128	112	127	118	208
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	↘	
Fallolyckor bland äldre	4 903	4 912	5 502	4 140	3 658
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.8a. Förstagångsinsjuknanden\* (antal per 100 000), 15 år och äldre, fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för kvinnor och män är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Hjärtinfarkt	229	147	311	0,8	15	177	609	1 400
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	↘	↘	↘	↘
Stroke	250	201	293	6,6	21	131	671	2 016
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↗	→	↘	↘	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Efter minst 7 hjärtinfarkt- respektive strokefria år. Avlidna och slutenvårdade.

Tabell 9.8b. Förstagångsinsjuknanden\* (antal per 100 000), 25 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Hjärtinfarkt	262	333	272	203
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Stroke	283	327	293	244
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Efter minst 7 hjärtinfarkt- respektive strokefria år. Avlidna och slutenvårdade.

Tabell 9.8c. Förstagångsinsjuknanden\* (antal per 100 000), 15 år och äldre, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Hjärtinfarkt	229	218	264	238	251
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘			
Stroke	250	243	277	240	241
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Efter minst 7 hjärtinfarkt- respektive strokefria år. Avlidna och slutenvårdade.

Tabell 9.9a. Avlidna respektive intensivvårdade med covid-19 (antal per 100 000) Ålders- och könsstandardiserade siffror. 2020 och 2021.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	–64 år	65– år
Dödlighet	111,2	106,2	116,2	5,7	516,6
IVA-vårdade	34,6	20,6	48,4	21,7	84,4

Källa: Folkhälsomyndigheten och Svenska intensivvårdsregistret (SIR/SIRI).

Tabell 9.9b. Avlidna respektive intensivvårdade med covid-19 (antal per 100 000), uppdelat på födelseland. 13 mars 2020 till 15 februari 2021. Ålders- och könsstandardiserade siffror.

Indikator	Dödlighet	IVA-vårdade
Sverige	111,2	34,6
Nordamerika	102,1	16,4
Västeuropa	114,7	39,3
Central- Östeuropa	162,9	57,4
Norden	150,4	50,5
Sydamerika	183,3	146,5
Sydösteuropa	215,9	132,5
Asien, Oceanien	213,4	157,6
Mellanöstern	308,8	190,3
Afrika	258,5	191,6

Källa: Folkhälsomyndigheten och Svenska intensivvårdsregistret (SIR/SIRI).

Tabell 9.9c. Vaccinationstäckning Covid-19 minst två doser (andelar i procent), fördelat på ålder, till och med 31 december 2020.

<b>Indikator</b>	<b>Förgymnasial</b>	<b>Gymnasial</b>	<b>Eftergymnasial</b>
30–64 år	72,9	83,1	88,2
65+ år	93,7	94,8	95,8

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.9d. Vaccinationstäckning Covid-19 minst två doser (andelar i procent), fördelat på kön och ålder, till och med 31 december 2020.

<b>Indikator</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>
Totalt	85,5	82,5
16–19	75,4	69,3
20–29	75,5	70,6
30–39	77,8	73,9
40–49	85,1	81,6
50–59	89	87,9
60–69	91,9	91,5
70–79	94,9	95
80+	95,1	96

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.10. Smittsamma sjukdomar (antal anmälda fall totalt\*), fördelat på kön, 2021.

<b>Indikator</b>	<b>Totalt</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>Uppgift saknas</b>
Covid-19	881 853	437 451	442 487	1 915
Campylobakterinfektion	4 059	1 800	2 243	16
Enterohemorragisk escherichia coli (EHEC)	653	337	311	5
Salmonella	946	497	444	5
Hepatit B	744	306	432	6
Hepatit C	1 131	398	730	3
Tuberkulos	365	161	204	0
Gonorré	2 700	545	2 148	7
Klamydia	30 184	16 529	13 608	47
Syfilis	591	45	545	1
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)	2 896	1 513	1 382	1
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)	209	89	120	0
Enterobacteriaceae med ESBL <sub>CARBA</sub>	138	69	69	0
Mässling	0	0	0	0
TBE	533	208	324	1

Källa: Folkhälsomyndigheten.

\*Antalet fall kan komma att justeras något.

Tabell 9.11. Smittsamma sjukdomar (antal anmälda fall totalt), fördelat på kön, säsongen 2020/2021.

<b>Indikator</b>	<b>Totalt</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>Uppgift saknas</b>
Influensa A	10	4	6	0
Influensa B	19	8	11	0
RS-virus	195	86	85	24
Vinterkräksjuka	376	185	187	4

Källa: Folkhälsomyndigheten.

---

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling



Folkhälsomyndigheten

[www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)