

Kvartalsstatistik från Strama


kvartal 1, 2009

Antibiotika som förskrivs på recept:

- Antibiotika (J01 exkl. metenamin), per månad, DDD/1000 invånare och dag, samt glidande medelvärde för 12 månader tillbaka.
- Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, per månad, recept/1000 invånare.
- Antibiotika som ofta används mot hud- och mjukdelsinfektioner, per månad, recept/1000 invånare.
- Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, per månad, kvinnor 18 - 79 år, recept/1000 invånare.
- Andel fluorokinoloner av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor 18 - 79 år, per län och 12-månadersperiod.
- Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, barn 0 - 6 år, per län och 12-månadersperiod.

Antibiotikaförsäljning på recept (J01 exkl. metenamin), alla åldrar, per månad DDD/1000 invånare och dag samt medelvärde 12 månader bakåt

Källa: Apoteket AB, Xplain




Något lägre försäljning under januari och februari 2009 jämfört med samma månader de föregående åren.

Antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, alla åldrar

Recept/1000 invånare

Källa: Apoteket AB, Xplain



De två största grupperna, penicillin V och doxycylin, visar en något lägre försäljning under hösten och vintern 2008 jämfört med tidigare år.

Antibiotika som ofta används mot hud- och mjukdelsinfektioner, alla åldrar

Recept/1000 invånare


Källa: Apoteket AB, Xplain



Antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektioner, kvinnor, 18-79 år

Recept/1000 invånare


Källa: Apoteket AB, Xplain



Försäljningen av fluorokinoloner till kvinnor mellan 18 och 79 år fortsätter att minska, medan nitrofurantoin verkar ha etablerat sig som näst vanligaste preparat.

Andel ciprofloxacin och norfloxacin av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion, kvinnor, 18-79 år
andel (%) av recept/1000 invånare, 12-månadersperioder

Källa: Apoteket AB, Xplain




En av Stramas kvalitetsindikatorer i öppenvård: Andel kinolonrecept av alla uthämtade recept på pivmecillinam (J01CA08), trimetoprim (J01EA01), nitrofurantoin (J01XE01) ciprofloxacin (J01MA02) och norfloxacin (J01MA06).

Andel PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, barn 0-6 år

Andel (%) av recept/1000 barn, 12-månadersperioder

Källa: Apoteket AB, Xplain




En av Stramas kvalitetsindikatorer för antibiotikaförskrivning i öppenvård: Andelen PcV av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektion, till barn mellan 0 och 6 år. I nämnaren finns amoxicillin, amoxicillin m. klavulanat, PcV, cefalosporiner och makrolider.

Antibiotika på slutenvårdsrekvisition:

- Några preparatgrupper, DDD/1000 invånare och dag.
- Andel cefalosporiner och fluorokinoloner av J01 exkl. metenamin, per län de senaste 12 månaderna.
- Andel PcV och PcG av J01 exkl. metenamin, per län de senaste 12 månaderna.

Antibiotika i slutenvård, några preparatgrupper DDD/1000 invånare och dag


Källa: Apoteket AB, Xplain



Från årsskiftet har penicilliner med smalt spektrum varit den mest använda antibiotikagruppen i slutenvård. Cefalosporinerna fortsätter att minska, delvis på grund av byte från cefuroxim till cefotaxim, medan piperacillin/tazobactam ökar.

Andel PcV och PcG av J01 exkl. metenamin, per län 12-månadersperioder tom. mars 2009


Källa: Apoteket AB, Xplain



Andelen smalspektrum-penicilliner i slutenvård ökar i nästan hela landet. Det är stora skillnader mellan länen i både andel och förändring.

Andel cefalosporiner och fluorokinolonder av J01 exkl. metenamin, per län 12-månadersperioder tom. mars 2009

Källa: Apoteket AB, Xplain



Andelen cefalosporiner och fluorokinolonder minskar i nästan alla län, vilket är i linje med bland annat Infektionsläkarföreningens rekommendationer för behandling av samhällsförvärd pneumoni respektive okomplicerad nedre UVI hos kvinnor.